

Flusterix®

Fusidic acid
κρέμα 2%



ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1 Όνομασία: Flusterix®

1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Fusidic Acid.

Έκδοχα: Butylated hydroxyanisole, Cetyl alcohol, Glycerol, Potassium sorbate, Paraffin liquid, Polysorbate 60, White soft paraffin, Purified water.

1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή: Κρέμα για δερματική χρήση.

1.4 Περιεκτικότητα: 1gr κρέμας Flusterix περιέχει 20mg Fusidic Acid.

1.5 Περιγραφή-Συσκευασία: Κάθε κουτί περιέχει ένα σωληνάριο από αλουμίνιο των 15g ή 30g κρέμας με βιδωτό καπάκι ασφαλείας από πολυαιθυλένιο και φύλλο οδηγιών.

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιβιοτικά για τοπική χρήση (ATC: D06AX01).

1.7 Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας για Ελλάδα και Κύπρο - Παρασκευαστής:

IASIS PHARMA

Λεωφ. Φυλής 137, 134 51 Καματερό Αττικής, Τηλ: +30210 2311031

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

To Flusterix είναι ένα αντιβιοτικό που προέρχεται από την καλλιέργεια του μήκυτα Fusidium Coccineum. Έχει έντονη αντιμικροβιακή δράση έναντι ενός αριθμού θετικών κατά Gram μικροοργανισμών. Οι σταφυλόκοκκοι, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που είναι ανθεκτικά στην πενικιλίνη ή και σε άλλα αντιβιοτικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο Flusterix.

Η θεραπευτική αποτελεσματικότητα του τοπικά εφαρμοζόμενου Flusterix οφελεται αφ' ενός στην έντονη αντιμικροβιακή του δράση σε μικροοργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση δερματικών λοιμώξεων και αφ' ετέρου στην μοναδική ικανότητα αυτού του αντιβιοτικού να εισχωρεί στο ανέπαφο δέρμα.

2.2 Ενδείξεις

Θεραπεία σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων του δέρματος και δερματικά αποστήματα.

2.3 Αντενδείξεις

Αντενδείκνυται αν είστε αλλεργικοί στο φουσιδικό οξύ και τα αλατά του ή εάν έχετε λοιμωξη από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς, όπως η Pseudomonas Aeruginosa.

2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

2.4.1 Γενικά:

Σε παρατεταμένη χρήση μπορεί να αναπτυχθούν ανθεκτικά στελέχη μικροβίων. Απαιτείται προσοχή να μην έλθει σε επαφή το φάρμακο με τα μάτια. Η τοπική χρήση του φαρμάκου θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και όχι αλόγιστα, ειδικά σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς για το φόβο ανάπτυξης ανθεκτικών προς το φάρμακο στελεχών σταφυλόκοκκου.

2.4.2 Χρήση κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό:

Η ασφάλεια κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό δεν έχει τεκμηριωθεί. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν το χρησιμοποιήσετε.

2.4.3 Χρήση στα παιδιά:

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

2.4.4 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:

Δεν αναφέρονται.

2.4.5 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα:

Δεν αναφέρονται ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα πλην των περιπτώσεων που ο ασθενής έχει εκδηλώσει υπερευαισθησία σε κάποιο από αυτά.

2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:

Δεν αναφέρονται.

2.6 Δοσολογία:

Η κρέμα Flusterix εφαρμόζεται στην πάσχουσα περιοχή 2-3 φορές ημερησίως για περίοδο όχι μεγαλύτερη των επτά (7) ημερών.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ήχωρίς επίδεση. Με επίδεση προτείνεται πιο αραιή εφαρμογή.

2.7 Υπερδόσολογία-Αντιμετώπιση:

Δεν αναφέρονται. Σε περίπτωση κατάποσης από λάθος ειδοποιήστε τον γιατρό σας.

Τηλ.κέντρου Δηλητηριάσεων +30210 77.93.777

2.8 Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής σε περίπτωση που παραλείψει να πάρει κάποια δόση

Εάν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο συνεχώς και παραλείψετε μία δόση, θα πρέπει να πάρετε τη δόση αυτή το συντομότερο δυνατόν.

Εάν, εν τούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, μη λάβετε τη δόση που παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία.

2.9 Ανεπιθύμητες ενέργειες:

Σπάνια τοπικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας, που εκδηλώνονται με τη μορφή δερματικού εξανθήματος και ερεθισμού στο σημείο εφαρμογής.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενέργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλο οδηγών χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας :

- Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr.
- Στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475, www.moh.gov.cy/phs, Fax: + 357 22608649.

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενέργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φάρμακου.

2.10 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος:

Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. Σε περίπτωση που η ημερομηνία έχει παρέλθει, μην χρησιμοποιήσετε το φάρμακο.

2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:

Η κρέμα Flusterix φυλάσσεται σε θερμοκρασία $\leq 25^{\circ}\text{C}$ και σε χώρο όπου δεν υπάρχει υγρασία.

2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγών: 01-2020

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευτεί το γιατρό σας.
- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανιστεί κάπιοι πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάστε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.
- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- Για την ασφάλεια και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
- Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που έχουν ήδη λήξι.
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η κρέμα Flusterix χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.