

επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

ΦΥΛΛΟΔΗΛΗ ΠΡΟΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗ

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο συμπληρώθηκε για σας. Δεν πρέπει να το δώσετε σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

1. Τι είναι το AXIBAL και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το AXIBAL
3. Πώς να πάρετε το AXIBAL
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το AXIBAL
6. Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AXIBAL ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το AXIBAL ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται διφωσφονικά. Περιέχει ιβανδρονικό οξύ. Δεν περιέχει ορμόνες. Το AXIBAL μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια της οστικής μάζας σταματούντας την απώλεια της περισσότερης οστικής μάζας στον περισσότερο γυναικείο και το λαμβάνουν, παρόλο που εκείνες δε θα μπορούσαν να δουν ή να νιώσουν τη διαφορά. Το AXIBAL μπορεί να βοηθήσει να μειωθούν οι πιθανότητες σπασίματος οστών (κατάγματα). Η μείωση αυτή έχει αποδειχθεί για τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης αλλά όχι του ισχίου. Το AXIBAL σας συνταγογραφήθηκε για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης επειδή έχετε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καταγμάτων. Η οστεοπόρωση είναι η ρεπίπωση και εξασθένιση των οστών, που παρατηρείται συχνά στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Στην εμμηνόπαυση, οι ωοθήκες της γυναίκας σταματούν να παράγουν τις θηλυκές ορμόνες, οι οποίες βοηθούν στη διατήρηση της υγείας του σκελετού της. Όσο νωρίτερα φθάσει μία γυναίκα στην εμμηνόπαυση, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος ανάπτυξης καταγμάτων στην οστεοπόρωση. Άλλα παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καταγμάτων περιλαμβάνουν:

- την ανεπαρκή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D με τη διατροφή
- το κάπνισμα ή την υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών
- την έλλειψη περπατήματος ή άλλης άσκησης με βάρη
- το οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης

Πολλά άτομα με οστεοπόρωση δεν έχουν συμπτώματα. Εάν δεν έχετε συμπτώματα, μπορεί να μην ξέρετε εάν πάσχετε από αυτήν. Ωστόσο, η οστεοπόρωση αυξάνει τις πιθανότητες για κάταγμα οστού, εάν τυχόν πέσετε ή κτυπήσετε. Τυχόν κάταγμα οστού μετά την ηλικία των 50 ετών μπορεί να αποτελεί σημείο οστεοπόρωσης. Η οστεοπόρωση μπορεί επίσης να προκαλέσει πόνο στην πλάτη, απώλεια ύψους και κούραση της πλάτης. Το AXIBAL προλαμβάνει την απώλεια της οστικής μάζας που οφείλεται στην οστεοπόρωση και βοηθά στον επανασχηματισμό της οστικής μάζας. Κατά τον τρόπο, το AXIBAL περιορίζει τις πιθανότητες κατάγματος των οστών. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής θα σας βοηθήσει επίσης να αποκοιμηθείτε το μέγιστο όφελος από τη θεραπεία σας. Αυτός περιλαμβάνει ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε ασβεστό και βιταμίνη D, περπάτημα ή οποιοδήποτε άλλο άσκηση με βάρη, αποφυγή του καπνίσματος και της υπερκατανάλωσης αλκοολούχων ποτών.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ AXIBAL

Μην πάρετε το AXIBAL

- Σε περίπτωση που είστε αλλεργικός (υπερευαίσθητος) στο ιβανδρονικό οξύ ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του AXIBAL.
- Εάν έχετε ορισμένα προβλήματα με τον οιστόφωγο σας (το σωλήνα που συνδέει το στόμα με το στομάχι σας) όπως στένωση ή δυσκοιλία στην κατάποση.
- Εάν δεν μπορείτε να σταθείτε ή να καθίσετε σε όρθια θέση για τουλάχιστον μία ώρα (60 λεπτά) τη φορά
- Εάν έχετε ή είχατε στο παρελθόν χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Μη χορηγείτε το AXIBAL σε παιδιά ή εφήβους.

Προσέξτε ιδιαίτερες με το AXIBAL

Ορισμένοι άνθρωποι χρειάζονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη λήψη του AXIBAL. Ρωτήστε το γιατρό σας:

- Εάν έχετε τυχόν διαταραχές του μεταβολισμού των ανοργάνων στοιχείων (όπως ανεπάρκεια βιταμίνης D).
- Εάν οι νεφροί σας δεν λειτουργούν κανονικά.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα στην κατάποση ή στην πέψη.
- Εάν υποβάλλεστε σε οδοντιατρική θεραπεία ή πρόκειται να υποβληθείτε σε οδοντιατρική επέμβαση ενημερώστε τον γιατρό σας ότι είστε σε θεραπεία με AXIBAL.

Ερεθισμός, φλεγμονή ή εξέλκωση του οιστόφωγου (του σωλήνα που συνδέει το στόμα με το στομάχι σας) συχνά με συμπτώματα έντονου θωρακικού πόνου, έντονου πόνου μετά από κατάποση φαγητού και/ή ποτού, σοβαρή ναυτία, ή έμετος είναι πιθανά να συμβούν, ιδιαίτερα εάν δεν πείτε ένα γεμάτο ποτήρι νερού βρύσης και/ή εάν ξεπλύνετε εντός μίας ώρας από τη λήψη του AXIBAL. Εάν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα, σταματήστε να παίρνετε AXIBAL και ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας.

Λήψη άλλων φαρμάκων: Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε άλλα φάρμακα ή εάν πήρατε πρόσφατα άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων που αγοράσατε χωρίς συνταγή. Ειδικά:

- Συμπτωμάτωνα που περιέχουν ασβεστό, μαγνήσιο, σίδηρο ή αργίλιο, καθώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις δράσεις του AXIBAL.
- Η ασπιρίνη και άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) [συμπεριλαμβανομένων ιβουπροφαίνης, νατριούχου δικλοφενάκης και ναπροξένης] μπορεί να ερεθίσουν το στομάχι και το έντερο. Τα διφωσφονικά (όπως το AXIBAL) μπορεί επίσης να προκαλέσουν ερεθισμό. Γι' αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν παίρνετε παυσίπονα ή αντιφλεγμονώδη ενόσω παίρνετε AXIBAL.

Αφού καταπιείτε το μνίσιο σας δισκίο AXIBAL, περιμένετε για 1 ώρα πριν πάρετε οποιοδήποτε άλλο φάρμακο, συμπεριλαμβανομένων των δισκίων για τη δυσπεψία, συμπληρωμάτων ασβεστίου ή βιταμινών.

Λήψη AXIBAL με τροφή και ποτά: Μη λαμβάνετε AXIBAL με τροφή. Το AXIBAL είναι λιγότερο δραστικό όταν λαμβάνεται με τροφή. Μπορείτε να πείτε νερό βρύσης αλλά όχι άλλα ποτά. (βλέπε 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AXIBAL).

Κύηση και θηλασμός: Πριν τη λήψη οποιοδήποτε φαρμάκου ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του AXIBAL σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει κάποια τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα. Το AXIBAL δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης. Δεν είναι γνωστό εάν το φάρμακο απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει παρουσία χαμηλών επιπέδων της δραστικής ουσίας στο γάλα. Το AXIBAL δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.

Οδηγίες και χειρισμός μηχανών: Μπορείτε να οδηγείτε και να χειρίζεστε μηχανές αφού θεωρείται παύση από την επηρεαστεί το AXIBAL την ικανότητά σας για οδηγία ή χειρισμό μηχανών.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του AXIBAL: Το AXIBAL περιέχει ένα συστατικό που ονομάζεται λακτόζη. Εάν ο γιατρός σας έχει πει ότι παρουσιάζετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AXIBAL

Πάρτε πάντα το AXIBAL αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Η συνήθης δόση AXIBAL είναι ένα δισκίο μια φορά το μήνα.

Λήψη του μνιού σας δισκίου: Είναι σημαντικό να ακολουθείτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Σκοπός είναι η διευκόλυνση της γρήγορης διάλυσης του δισκίου AXIBAL στο στομάχι σας, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες πρόκλησης ερεθισμού.

- Πάρτε ένα δισκίο AXIBAL 150 mg μια φορά το μήνα.
- Διαλέξτε μια ημέρα του μήνα την οποία θα είναι εύκολο να θυμάστε. Μπορείτε να διαλέξετε είτε την ίδια ημερομηνία (όπως την 1η κάθε μήνα) ή την ίδια ημέρα (όπως την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα) για να πάρετε το δισκίο σας AXIBAL. Διαλέξτε την ημερομηνία που ταιριάζει καλύτερα στο πρόγραμμά σας.
- Πάρτε το δισκίο AXIBAL τουλάχιστον 6 ώρες μετά την τελευταία κατανάλωση οποιασδήποτε τροφής ή ποτού εκτός από νερό βρύσης.
- Πάρτε το δισκίο AXIBAL αφού σηκωθείτε για πρώτη φορά μέσα στη μέρα και πριν φάτε ή πείτε οτιδήποτε (με άδειο στομάχι)
- Καταπιείτε το δισκίο σας με ένα γεμάτο ποτήρι νερού βρύσης (τουλάχιστον 180 ml). Μην πάρετε το δισκίο σας με μεταλλικό νερό, φρουτοχυμό ή οποιοδήποτε άλλο ποτό.

- Καταπιείτε το δισκίο σας ολόκληρο – μην το μασάτε, μην το θρυμματίζετε και μην το αφήνετε να διαλυθεί στο στόμα σας.

- **Κατά τη διάρκεια της ώρας (60 λεπτών) που ακολουθεί τη λήψη του δισκίου σας**

- **Μην ξαπλώσετε:** εάν δεν παρμένετε σε όρθια θέση (είτε στέκεστε είτε κάθεστε), κάποια ποσότητα του φαρμάκου μπορεί να διαφύγει προς τον οισοφάγο σας

- **μην φάτε τίποτε**

- **μην πιείτε τίποτε** (εκτός από νερό βρύσης, εφόσον χρειάζεστε)

- **μην πάρετε κανένα άλλο φάρμακο**

- Αφού παρμένετε για μία ώρα, μπορείτε να φάτε ή να πιείτε για πρώτη φορά μέσα στη μέρα. Αφού φάτε, μπορείτε εάν θέλετε να ξαπλώσετε και να πάρετε οποιοδήποτε άλλο φάρμακο χρειάζεστε.

Μην πάρετε το δισκίο σας πριν πάτε για ύπνο ή πριν σηκωθείτε το πρωί.

Συνέχιστε τς λήψης AXIBAL: Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε το AXIBAL κάθε μήνα για όσο χρονικό διάστημα σας το συνταγογραφεί ο γιατρός σας. Το AXIBAL μπορεί να θεραπεύσει την οστεοπόρωση μόνο για το χρονικό εκείνο διάστημα για το οποίο συνεχίσετε να το παίρνετε.

Εάν πάρετε υπερβολική δόση AXIBAL: Εάν πήρατε κατά λάθος περισσότερο από ένα δισκίο, πιείτε ένα γεμάτο ποτήρι γάλα και επικοινωνήστε άμεσα με το γιατρό σας. Μην προσπαθήσετε να κάνετε εμετό και μην ξαπλώσετε – κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ερεθισμό του οισοφάγου σας από το AXIBAL.

Εάν ξεχάσετε μία δόση: Εάν ξεχάσετε να πάρετε το δισκίο σας το πρωί της ημέρας που έχετε επιλέξει, μην πάρετε δισκίο αργότερα μέσα στην ημέρα. Αντ' αυτού, συμβουλευτείτε το ημερολόγιό σας και βρείτε πότε είναι η επόμενη προγραμματισμένη δόση σας:

Εάν η επόμενη προγραμματισμένη δόση σας απέχει μόνο 1 έως 7 ημέρες τότε, παρμένετε μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη δόση σας και πάρτε την όπως συνήθως.

Εάν η επόμενη προγραμματισμένη δόση σας απέχει περισσότερο από 7 ημέρες τότε πρέπει να πάρετε ένα δισκίο το επόμενο πρωί μετά την προγραμματισμένη ημέρα και έπειτα συνεχίστε να παίρνετε ένα δισκίο μία φορά το μήνα τις προγραμματισμένες ημέρες που έχετε σημειώσει στο ημερολόγιό σας.

Ποτέ μην παίρνετε δυο δισκία AXIBAL κατά τη διάρκεια της ίδιας εβδομάδας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το AXIBAL μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν εμφανίζονται άμεσα σε όλους.

Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να συμβούν με συγκεκριμένες συχνότητες, οι οποίες ορίζονται ως ακολούθως:

- **πολύ συχνές:** επηρεάζει περισσότερους από 1 χιλιάδες στους 10

- **συχνές:** επηρεάζει από 1 έως 10 χιλιάδες στους 100

- **όχι συχνές:** επηρεάζει από 1 έως 10 χιλιάδες στους 1.000

- **σπάνιες:** επηρεάζει από 1 έως 10 χιλιάδες στους 10.000

- **πολύ σπάνιες:** επηρεάζει από 1 έως 10 χιλιάδες στους 100.000

- **μη γνωστές:** η συχνότητα δε μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η στομαχική καούρα, η δυσπεψία, η διάρροια, ο πόνος στο στομάχι και η ναυτία. Το AXIBAL μπορεί να ερεθίσει τον οισοφάγο, αν και συνήθως μπορεί να αποφεύγεται κάτι τέτοιο παίρνοντας τη δόση σας όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών. Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα όπως έντονο πόνο στο στήθος, έντονο πόνο μετά την κατάποση τροφής ή ποτού, έντονη ναυτία ή έμετο, σταματήστε αμέσως τη λήψη του AXIBAL και επικοινωνήστε με το γιατρό σας χωρίς καθυστέρηση.

Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν εξόδημα, κράμπες στους μύς και στις αρθρώσεις και πονοκέφαλο. Επίσης περιλαμβάνουν συμπτώματα που μοιάζουν με εκείνα της γρίπης (άγχη και πόνοι, αίσθημα δυσφορίας, κόπωση) τα οποία είναι ήπια και μικρής διάρκειας και υποχωρούν σύντομα μετά τη λήψη της πρώτης δόσης σας. Έτσι αναμένεται ότι θα μπορείτε να συνεχίσετε τη θεραπεία σας με AXIBAL. Εάν οποιοδήποτε σύμπτωμα γίνει ενοχλητικό ή διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μιλήστε με το γιατρό σας.

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η ζάλη, η ασφαλγία και οι μετεωρισμοί.

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι το οίδημα και ο κνησμός του προσώπου, των χεριών και του στόματος.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε παρενέργειες που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ AXIBAL

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Μην χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί μετά τη "ΛΗΞΗ" ή "EXP. DATE".

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.

Το φάρμακο δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα ακουμπιά. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε το φάρμακο που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το AXIBAL: Η δραστική ουσία είναι το ιβανδρονικό οξύ. Κάθε δισκίο περιέχει 150 mg ιβανδρονικού οξέος.

Τα άλλα συστατικά είναι: πυρήνας δισκίου: lactose monohydrate, cellulose microcrystalline, croscarmellose sodium, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, επικάλυψη δισκίου: hydroxypropylcellulose, titanium dioxide (E171), macrogol 6000

Εμφάνιση του AXIBAL και περιεχόμενα της συσκευασίας: Το δισκίο AXIBAL είναι λευκό επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο, επιμήκους σχήματος, με ένδειξη "LC" στη μία πλευρά. Το δισκίο διατίθεται σε blisters που περιέχουν 1 ή 3 δισκία.

Στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσουν και τα δυο μεγέθη συσκευασιών.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: ISIS PHARMA

Λεωφ. Φυλίας 137, 134 51 Καματερό Αττικής. Τηλ: 210 6109080

Παρασκευαστής: Laboratoris LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, N1 7, Poligono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), SPAIN

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις: 8-9-2011

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή

anba 02-2013/iss

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγγραφεί στα Κράτη-Μέλη του ΕΟΧ με τις παρακάτω ονομασίες:

[NO/H/153/001/DC]:

Austria: Bonafurbit 150 mg Filmtabletten
Belgium: Bonafurbit 150 mg Comprims pelliculés
Bulgary: Bonafurbit 150 mg Филмირана таблетка
Czech Republic: Bonafurbit 150 mg potahované tablety
Denmark: Bonafurbit 150 mg Filmovertrukket tablet
Estonia: Bonafurbit 150 mg
Finland: Bonafurbit 150 mg Tabletti, kalvopäällysteinen
France: Bonafurbit 150 mg Comprims pelliculés
Germany: Bonafurbit 150 mg Filmtabletten
Greece: Bonafurbit 150 mg Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Hungary: Bonafurbit 150 mg Filmtableta
Ireland: Bonafurbit 150 mg Film-coated tablets
Italy: Bonafurbit 150 mg Compressa rivestita con film
Latvia: Bonafurbit 150 mg Apvalkotās tabletes
Lithuania: Bonafurbit 150 mg Pliėvele dengtos tabletės
Luxembourg: Bonafurbit 150 mg Comprims pelliculés
Netherlands: Bonafurbit 150 mg Filmomhulde tabletten
Norway: Bonafurbit 150 mg Tablett, filmdrasjert
Poland: Bonafurbit
Portugal: Bonafurbit 150 mg
Sweden: Bonafurbit 150 mg Filmdragerad tablet
Slovak Republic: Bonafurbit 150 mg
Slovenia: Bonafurbit 150 mg Filmsko obložene tablete
United Kingdom: Bonafurbit 150 mg Film-coated tablets

[NO/H/158/001/DC]:

Austria: Ibandronsäure Liconsa 150 mg Filmtabletten
Belgium: Ibandronic acid Liconsa 150 mg Comprims pelliculés
Bulgary: Ибандронова киселина Liconsa 150 mg Филмირана таблетка
Czech Republic: Ibandronic acid Liconsa 150 mg potahované tablety
Denmark: Ibandronsyre Liconsa 150 mg Filmovertrukket tablet
Estonia: Ibandronic acid Liconsa 150 mg
Finland: Ibandronihappoa Liconsa 150 mg Tabletti, kalvopäällysteinen
France: Acide ibandronique Liconsa 150 mg Comprims pelliculés
Germany: Ibandronsäure Liconsa 150 mg Filmtabletten
Greece: Ιβανδρονικό οξύ Liconsa 150 mg Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο

Ireland: Ibandronic acid Liconsa 150 mg Film-coated tablets
Italy: Acido ibandronico Liconsa 150 mg Compressa rivestita con film
Latvia: Ibandronskābes Liconsa 150 mg Apvalkotās tabletes
Lithuania: Ibandrono rūgšties Liconsa 150 mg Pliėvele dengtos tabletės
Netherlands: Ibandroniezuur Liconsa 150 mg Filmomhulde tabletten
Norway: Ibandronsyre Liconsa 150 mg Tablett, filmdrasjert
Poland: Kwasa ibandronowego Liconsa
Portugal: Acido ibandronico Liconsa 150 mg
Sweden: Ibandronsyra Liconsa 150 mg Filmdragerad tablet
Slovak Republic: Kyselina ibandronová Liconsa 150 mg
Slovenia: Ibandronska kislina Liconsa 150 mg Filmsko obložene tablete
United Kingdom: Ibandronic acid Liconsa 150 mg Film-coated tablets

[NO/H/159/001/DC]:

Czech Republic: Axibal 150 mg potahované tablety
Greece: Axibal 150 mg Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Hungary: Axibal 150 mg Filmtableta
Italy: Axibal 150 mg Compressa rivestita con film
Norway: Axibal 150 mg Tablett, filmdrasjert
Poland: Axibal
Slovak Republic: Axibal 150 mg

[NO/H/160/001/DC]:

Austria: Kefort 150 mg Filmtabletten
Bulgary: Kefort 150 mg Филмირана таблетка
Czech Republic: Kefort 150 mg potahované tablety
Estonia: Kefort 150 mg
France: Kefort 150 mg Comprims pelliculés
Germany: Kefort 150 mg Filmtabletten
Greece: Kefort 150 mg Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Ireland: Kefort 150 mg Film-coated tablets
Italy: Kefort 150 mg Compressa rivestita con film
Latvia: Kefort 150 mg Apvalkotās tabletes
Lithuania: Kefort 150 mg Pliėvele dengtos tabletes
Norway: Kefort 150 mg Tablett, filmdrasjert
Poland: Kefort
Portugal: Kefort 150 mg
Slovenia: Kefort 150 mg Filmsko obložene tablete
Slovak Republic: Kefort 150 mg
United Kingdom: Kefort 150 mg Film-coated tablets

[NO/H/161/001/DC]:

Greece: Nucodran 150 mg Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο

δισκίο

Italy: Nucodran 150 mg Compressa rivestita con film
Lithuania: Nucodran 150 mg Pliėvele dengta tablete
Norway: Nucodran 150 mg Tablett, filmdrasjert
Poland: Nucodran 150 mg
Slovak Republic: Nucodran 150 mg

[NO/H/162/001/DC]:

France: Vinodran 150 mg Comprims pelliculés
Germany: Vinodran 150 mg Filmtabletten
Italy: Vinodran 150 mg Compressa rivestita con film
Norway: Vinodran 150 mg Tablett, filmdrasjert
Spain: Vinodran 150 mg Comprims recubiertos con película
United Kingdom: Vinodran 150 mg Film-coated tablets

[NO/H/167/001/DC]:

Austria: Licobondrat 150 mg Filmtabletten
Belgium: Licobondrat 150 mg Comprims pelliculés
Bulgary: Licobondrat 150 mg Филмირана таблетка
Czech Republic: Licobondrat 150 mg potahované tablety
Denmark: Licobondrat 150 mg Filmovertrukket tablet
Estonia: Licobondrat 150 mg
Finland: Licobondrat 150 mg Tabletti, kalvopäällysteinen
France: Licobondrat 150 mg Comprims pelliculés
Germany: Licobondrat 150 mg Filmtabletten
Hungary: Licobondrat 150 mg Filmtableta
Italy: Licobondrat 150 mg Compressa rivestita con film
Latvia: Licobondrat 150 mg Apvalkotās tabletes
Lithuania: Licobondrat 150 mg Pliėvele dengtos tabletes
Luxembourg: Licobondrat 150 mg Comprims pelliculés
Netherlands: Licobondrat 150 mg Filmomhulde tabletten
Norway: Licobondrat 150 mg Tablett, filmdrasjert
Portugal: Licobondrat 150 mg
Sweden: Licobondrat 150 mg Filmdragerad tablet
Slovak Republic: Licobondrat 150 mg
Spain: Licobondrat 150 mg Comprims recubiertos con película
United Kingdom: Licobondrat 150 mg Film-coated tablets

[NO/H/168/001/DC]:

France: Raiban 150 mg Comprims pelliculés
Germany: Raiban 150 mg Filmtabletten
Norway: Raiban 150 mg Tablett, filmdrasjert
Portugal: Raiban 150 mg

[NO/H/169/001/DC]:

Germany: Ibatec 150 mg Filmtabletten
Norway: Ibatec 150 mg Tablett, filmdrasjert