

Κρέμα 0,1%+2%

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμπορική ονομασία φαρμάκου: COMBI

Σύνθεση:

Δραστικές ουσίες: Fluprednidene acetate, Miconazole nitrate

Οξείο φλουρενδινόνιο, Νιτρική μικοναζόιλη

Εκδοχα: Dimeticone, Triglycerides medium chain, White soft paraffin, Glyceryl monostearate 40-50%, Arlacet 165, Stearyl alcohol, Propylene glycol, Water purified.

Φαρμακοτεχνική μορφή: Κρέμα

Περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες: 1g κρέμας COMBI περιέχει 1mg Fluprednidene acetate και 20mg Miconazole nitrate.

Περιγραφή – Συσκευασία:

Σωλήναριο που περιέχει 20g, ή 50g κρέμας εξωτερικής χρήσης.

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία:

Τοπικό αντιφλεγμονώδες και αναυμκυπασικό.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας- Παρασκευαστής: IASIS PHARMA,

Λεωφ. Φυλής 137, 134 51 Καματερό Αττικής, Ελλάδα.

Τηλ.: 210 2311031

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

Γενικές πληροφορίες:

Η κρέμα εξωτερικής χρήσης COMBI περιέχει δύο δραστικά συστατικά: Fluprednidene acetate και Miconazole nitrate.

To Fluprednidene acetate είναι ένα γηλικοκορτικοστεροειδές με αντιαλλεγρική, αντικνημώδη και αντιφλεγμονώδη δράση. Η Miconazole nitrate είναι ένα αντιμυκοποσικό φάρμακο. Κλινικά αποδεικτική αποτελεσματική έναντι των δερματοφύτων, Candida spp, Pityrosporum spp, Torulopsis glabrata, Aspergillus spp, Dimorphic fungi, Cryptococcus neoformans. Η Miconazole nitrate έχει επίσης αντιβακτηριακή δράση έναντι κάποιων Gram (+) βακιλίων και κόκκων.

Ενδείξεις:

Η κρέμα εξωτερικής χρήσης COMBI ενδείκνυται σε φλεγμονώδεις δερματοκυπαρίσσεις (που οφείλονται σε δερματόφυτα, βλαστομύκτες και/ή ευρωτομύκτες). Επίσης ενδείκνυται σε έκζεμα αναμοιησμένο από μύκτες.

Η κρέμα εξωτερικής χρήσης COMBI ενδείκνυται κυρίως για την έναρξη της θεραπείας. Μόλις τα συμπτώματα της φλεγμονής εξαφανιστούν, τότε η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί με μια κρέμα που περιέχει ως δραστικό μόνο Miconazole nitrate αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Αντενδείξεις:

Η κρέμα COMBI δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ορισμένες ειδικές δερματικές παθήσεις (σύφιτη, φυματίωση), σε μοιλύνσεις που οφείλονται σε ορισμένους ιούς (απλός έρπιτας, έρπιτας ζωστήρας, ανεμοβλογιά), σε ανιδράσεις από εμβολιασμούς, σε ροδόχροα ακμή, σε ακμή και σε πρωτογενείς διαπυτικές δερματικές μοιλύνσεις.

Αντενδείκνυται επίσης σε περιπτώσεις αποδειγμένης υπερευασθησίας στα συστατικά του προϊόντος.

Η κρέμα COMBI δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πολύ μικρά παιδιά και βρέφη.

Η κρέμα COMBI δεν πρέπει να εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών, στα βλέφαρα, σε δέρμα που έχει γίνει ισχνό, σε πληγές και σε έλκη του δέρματος. Η επαγγίμενη πρέπει να αποφεύγεται.

Τα τοπικά σκευάσματα κορτικοστεροειδών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αδιάγνωστης δερματοπάθειας. Ακόμη θα

πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους σε περιπτώσεις ακμής, περιστοματικής δερματίτιδας, σε άτονα έλκη, απλή και σε εγκαύματα, επειδή παρεμποδίζουν την επούλωση.

Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποίησης κατά τη χρήση:

Η κρέμα COMBI δεν πρέπει να εφαρμόζεται για μεγάλη χρονικά διαστήματα, σε εκτεταμένες περιοχές του δέρματος και/ή με επίδεση, ιδιαίτερα σε παιδιά.

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει πιθανότητα μόλυνσης από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς.

Μετά τη διακοπή της θεραπείας είναι πιθανό να επανεμφανιστούν τα συμπτώματα. Τα κορτικοστεροειδή σκευάσματα μπορεί να συγκαλύψουν τα συμπτώματα ορισμένων καταστάσεων εμποδίζοντας έτσι μια ορθή διάγνωση.

Εάν 15 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας δεν έχετε βεβίωση ότι πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας για να επαναχρησιογίσει την κατάστασή σας.

Χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού:

Η χρήση της κρέμας COMBI δε συνιστάται κατά τους 3 πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης, γιατί δεν υπάρχει σχετική κλινική εμπειρία. Αν και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ενδείξεις για κίνδυνο τερατογόνου δράσης των γηλικοκορτικοστεροειδών στον άνθρωπο, εν τούτοις, σε περίπτωση μακροχρόνιας θεραπείας, δεν μπορεί να αποκλείσθει το ενδεχόμενο ανωμαλίων στο έμβρυο. Τοπική εφαρμογή ισχυρών κορτικοστεροειδών σε έγκυα ζώνα έχει προκαλέσει ανωμαλίες στην ανάπτυξη του έμβρυου. Για το λόγο αυτό, τα τοπικά κορτικοστεροειδή μπορούν να χορηγούνται κατά την εγκυμοσύνη μόνο από το αναμενόμενο οφέλος δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν πρέπει να χορηγούνται σε μεγάλες ποσότητες ή για μακρύ χρονικό διάστημα. Αν είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση σε μεγάλη έκταση δέρματος, ούτε για μεγάλο χρονικό διάστημα και γενικότερα θα πρέπει να σταθμιστεί από το γιατρό το αναμενόμενό οφέλος έναντι του πιθανού κινδύνου.

Τα κορτικοστεροειδή περνούν στο μητρικό γάλα, γι' αιτό, όπως και κατά την εγκυμοσύνη, χρειάζεται προσοχή και κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Όταν η χρήση κορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια του θηλασμού κρίνεται απαραίτητη, η ποσότητα του φαρμάκου και η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να περιορίζονται στο επλάκιστο.

Οσον αφορά τα τοπικά σκευάσματα κορτικοστεροειδών, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Να αποφεύγεται η μακροχρόνη χρήση στα παιδιά.

Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πιο επιρρεπείς σε συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών, διότι μπορεί να απορροφήσουν μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκου, λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας του δέρματος σε σχέση με το θάρος σώματος.

β. Όταν εφαρμόζεται στεγανή επίδεση, πρέπει να γίνεται σύσταση για καθαρισμό του δέρματος, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιμόλυνση.

γ. Να μη γίνεται χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών πέρα των 3 εβδομάδων χωρίς επανείσταση από δέρματοπλόγο.

δ. Μετά από επανείτημένη εφαρμογή, τουλάχιστον 10-15 ημερών, μπορεί να παρατηρηθεί προσωρινή μείωση ή απώλεια της δραστικότητας των κορτικοστεροειδών (ίδιας των φθοριωμένων) λόγω ταχυφύλαξης. Το φαινόμενο αυτό αποκαθίσταται μετά από διακοπή της χρήσης ολιγών ημερών ή εβδομάδων.

ε. Στην ψωρίαση να χορηγούνται με φειδώ και με επίθημεψη ειδικού,

διότι πέραν της προσωρινής αφέλειας, μακροχρονίως και μετά τη διακοπή της θεραπείας υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της νόσου. σ. Λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών από πιθανή απορρόφηση απαιτείται προσοχή όταν εφαρμόζεται σε μεγάλες επιφάνειες δέρματος ή σε παρατεταμένο χορήγηση ιδιαίτερα σε παιδιά καθώς και ασθενείς με βαριές νεφροπάθειες, αιμορραγική διάθεση και σε επικείμενους ευβολίασμούς.

ζ. Γενικά θα πρέπει να επιλέγεται το οπιγότερο ισχυρό κορτικοστεροειδές που θεωρείται αποτελεσματικό για την ένδειξη που παρορίζεται και επί μιαντοπορίσεως να χορηγείται άλλη ίδια ισχύος ή μεγαλύτερης.

η. Ενδέκεται να προκαλέσει καταρράκτη και γηλάκωμα όταν χρησιμοποιείται στην περιοχή πλησίον των οφθαλμών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αν γίνεται τοπική χρήση στα βλέφαρα χρειάζεται προσοχή ώστε το φάρμακο να μην έρθει σε επαφή με τον οφθαλμό.

Αληθηπειδράσεις με άλλη φάρμακα ή ουσίες:

Δεν υπάρχουν γνωστές αληθηπειδράσεις σε τοπική εφαρμογή.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:

Εφαρμόζεται με μια ειλαφρά επάλευψη στην πάσχουσα περιοχή μια ως δύο φορές την ημέρα. Η κρέμα για εξωτερική χρήση COMBI πρέπει συνήθως να χρησιμοποιείται για 1 ακόμη εβδομάδα μετά την εξαφάνιση των συμπτωμάτων.

Υπερδοσολογία – Ανατριχίωση:

Παρατεταμένη και υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσουν σε δερματικούς ερεθισμούς και δερματική ατροφία, καθώς και σε καταστατική επίδραση στο φλοιό των επινεφρίδων οφειλόμενη σε αυξημένη απορρόφηση. Ο ερεθισμός του δέρματος και η δράση στο φλοιό των επινεφρίδων εξαφανίζονται μετά τη διακοπή της θεραπείας, αλλά η δερματική ατροφία μπορεί να παραμείνει.

Αν από λίθιος ληφθεί το φάρμακο από το στόμα, δεν παρουσιάζεται κανέναν πρόβλημα, γιατί η ποσότητα των δραστικών συστατικών είναι μικρή και η δράση της Fluprednidene παρέρχεται γρήγορα.

Τηλέφωνο Κέντρου Διπλητηρίασεων 210-7793777 - Αθήνα.

Τι πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση που παρατείψατε να πάρετε κάποια δόση:

Εάν πρέπει να λιμβάνετε το φάρμακο συνεχώς και παρατείψατε μια δόση, θα πρέπει να πάρετε τη δόση αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Εάν, εν τούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση μη λίβετε τη δόση που παρατείψατε αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:

Η τοπική θεραπεία με κρέμα COMBI είναι συνήθως καλά ανεκτή.

Η μακροχρόνια θεραπεία με κρέμα εξωτερικής χρήσης COMBI και/ή η εφαρμογή της σε εκτεταμένες περιοχές του δέρματος κυρίως με επίδεση, μπορεί να προκαλέσουν δερματικές αίλιοιώσεις όπως ατροφία, τηλεαγγειεκτασία, εκτεταμένες ραβδώσεις, στεροειδή ακύρη, περιστοματική δερματίδα, υπερτρίχωση και αποχρωματισμό του δέρματος. Επίσης μπορεί να προκαλέσει καταστολή στη λειτουργία του άρχοντα υπόφουτο – επινεφρίδια.

Σε σπάνιες μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν αληθηγικές ή ερεθιστικές αντιδράσεις του δέρματος που μπορεί να οδηγήσουν σε δερματικά εξανθήματα.

Όσον αφορά τα τοπικά σκευάσματα κορτικοστεροειδών έχουν αναφερθεί οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες :

Τοπικές μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με τα ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή στις θέσεις εφαρμογής τους, είναι :

Αίσθηση καύσου, κυνηγόσ, ερεθισμός, ξηρότητα, θυλακίτιδα, υπορεπλάγχωση, πλέτυνση του δέρματος, τηλεαγγειεκτασίες.

Τροποποίηση της κλινικής εικόνας επί ληπαθασμένης χρήσης (μυκπιάσεις, ψώρα). Δευτεροπάθης πλούμωξη, τοπικές μικροβιακές πλαιώξεις (έναρξη πλανθάνουσας πλούμωξης ή επιδείνωσης εξεπλασμάτων), μυκτιασικές πλούμωξεις, διευκόλυνση της έναρξης μολυσματικής τερημίνθου και οξυτενών κονδυλωμάτων.

Αναστολή της επούλωσης τραυμάτων, ακμοειδή στοιχεία, φλυκταινίδια, θερινή ιδρώση, περιστοματική δερματίτιδα, εξάνθημα υπό μορφή ροδόχρου ακμής, υποτροπή φλυκταινώδους ψωρίασης επί διακοπής της θεραπείας (Rebound Phenomenon), απροφία του δέρματος υπό μορφή ουλής, γραμμοειδείς ραβδώσεις, ευρυαγγείες, πορφυρικά εξανθήματα, ερύθημα διάχυτο, βλαπτό-φυσαθλίδωδη άτυπα εξανθήματα, αιθλεργική υπερευαισθησία, τοπική υπερτρίχωση.

Αν εμφανιστούν συμπτώματα υπερευαισθησίας, θα πρέπει να χορήγηση σε σταματήσει αμέσως.

Οι παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι συνήθεις, αλλά μπορεί να εμφανιστούν συχνότερα με τη χρήση στεγανής επίδεσης ή μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση.

Γενικές μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση

Καταστολή της λειτουργίας του φλοιο-επινεφρίδιού άξονα, πτώση του επιπέδου της κορτικόζησης στο πιθάσμα-ούνδρομο CUSHING.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενέργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας.

Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλιθο οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας : Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr.

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενέργειών μπορείτε να θοιβήσετε στη συλλογή περισσότερων πιληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των παρόντων φαρμάκου.

Ημερομηνία ήπιξης του προϊόντος:

Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.

Σε περίπτωση που η πρερομηνία αυτή έχει περάσει, μη χρησιμοποιείτε το φάρμακο.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:

Να φυλάσσεται σε δροσερές συνθήκες ($\leq 25^{\circ}\text{C}$) και μακριά από τα παιδιά.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλιου οδηγιών:

01-10-2013

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

• Το φάρμακο αυτό το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να δίνετε σε άλλη άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, κωρίς προηγουμένων να έχετε αιμοβουλεύειτε το γιατρό σας.

• Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

• Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πιληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λιμβάνετε ή χρειάζεστε καθημερίτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πιληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

• Για να έναις αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λιμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.

• Για την ασφάλεια σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πιληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.

• Να μη διατηρήσετε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να τα αιλιούσουν και να τα καταστήσουν επιβλαβή για την υγεία σας.

• Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πιλέον ή που έχουν ήδη ήπιξει.

• Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.