

πόσιμο διάλυμα 0,5mg/ml

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε ολόκληρο το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης προτού να αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ισως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε μόνο για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Αυτό το φάρμακο μπορεί να τους βλάψει, οικόμα και δότων τα σημεία της ασθενείας τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν εμφανίσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό ή το νοσηλευτή σας. Αυτό περιλαμβάνει και ανεπιθύμητες ενέργειες που πιθανόν να μην αναγράφονται στο παρόν φύλλο οδηγιών. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το Contrahist και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Contrahist
3. Πώς να πάρετε το Contrahist
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Contrahist
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CONTRAHIST ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Η διϋδροχλωρική λεβδοσεπιρίζην είναι το δραστικό συστατικό του Contrahist. Το Contrahist είναι ένα αντιαλεργικό φάρμακο (αντισταμινικό για συστηματική χρήση).

Χρησιμοποιείται για θεραπεία συμπτωμάτων που σχετίζονται με:

- αλλεργική ρινίτιδα (συμπεριλαμβανομένης της εμμένουσας αλλεργικής ρινίτιδας),
- χρόνια διοταθή κνιδωση

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ CONTRAHIST

Μην χρησιμοποιήστε το Contrahist

- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευασθησίας) στη διϋδροχλωρική λεβδοσεπιρίζην ή σε κάποιο αντισταμινικό ή άλλα συστατικά αυτού του φαρμάκου (που αναγράφονται στην παράγραφο 6).
- σε περίπτωση που πάσχετε από σοβαρή έκπωση της νεφρικής λειτουργίας (σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια με κάθαρση κρεατινίνης κάτω από 10 ml/min).

Προσδοτήσεις και προφυλάξεις

- Δεν συνιστάται η χρήση του Contrahist σε βρέφη και νήπια ηλικίας κάτω των 2 ετών.
- Εάν πιθανόν δεν μπορείτε να κενώσετε την κύστη σας (λόγω καταστάσεων όπως τραυματισμός του νωπιού μελού ή υπερπλασία του προστάτη) συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Άλλα φάρμακα και Contrahist

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

Χρήση του Contrahist με φαγητό και ποτό

Συνιστάται προσοχή στην πάρετε το Contrahist ταυτόχρονα με οινόπνευμα.

Σε ειδικήθησος ασθενείες, η ταυτόχρονη χρήση στεπιρίζηνς ή λεβδοσεπιρίζηνς και οινοτνεύματος ή άλλων φαρμάκων που έχουν δράση στον εγκέφαλο, μπορεί να επιφεύγουν την εγρήγορση.

Κύνηση και γαλαουχία

Συμβουλευθείτε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Ενημερώστε το γιατρό σας αν είστε έγκυος, προσπαθείτε να μείνετε έγκυος ή θηλάζετε.

Ικανότητα οδήγησης και χειρισμός μηχανημάτων

Μερικοί ασθενείς που λαμβάνουν Contrahist μπορεί να νιώσουν υπνηφαίνωση, κόπωση και αδυναμία. Με προσοχή θα οδηγείτε ή να χειρίζεσθε μηχανήματα μέχρι να καταλάβετε πώς το φάρμακο σας επηρεάζει.. Ωστόσο, ειδικές δοκιμασίες έχουν δείξει ότι πως δεν επηρεάζεται η διανοτική εγρήγορση, η ικανότητα αντιδρασης ή η ικανότητα οδήγησης υγιών απόμων που υποβλήθηκαν σε αυτές τις δοκιμασίες μετά τη λήψη λεβδοσεπιρίζηνς στη συνιστώμενη δοσολογία.

To Contrahist περιέχει μαλπιτόλη

Αν ο γιατρός σας έχει ενημερώσει ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε μαζί του πριν πάρετε το φάρμακο αυτό.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CONTRAHIST

Να λαμβάνετε πάντοτε αυτό το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευθείτε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

Δοσολογία

Η συνήθης δόση είναι:

- Ενήλικες και παιδιά άνω των 6 ετών: πόσιμο διάλυμα 10 ml μια φορά την ημέρα
- Ενήλικες και παιδιά ηλικίας 2 μέχρι 6 ετών: πόσιμο διάλυμα 2,5 ml δύο φορές την ημέρα
Λόγω έλλειψης δεδομένων σε αυτό το πλήθυσμό, δεν συνιστάται η χρησή σε παιδιά που προϊόντος σε βρέφη και νήπια ηλικίας κάτω των 2 ετών.

Ιδιαίτερες οδηγίες δοσολογίας για ειδικούς πληθυσμούς:

- Ασθενείς με έκπωση στη νεφρική λειτουργία μπορούν να παίρνουν μικρότερη δόση ανάλογα με τη βαρύτητα της νεφρικής νόσου τους, ενώ η δόση για τα παιδιά πρέπει επίσης να είναι ανάλογη με το βάρος τους σώματός τους. Η δόση θα οριστεί από το γιατρό σας.
- Ασθενείς με σοβαρή έκπωση της νεφρικής λειτουργίας δεν πρέπει να πάρουν το Contrahist.
- Ασθενείς που πάσχουν μόνο από έκπωση στης ηπατική λειτουργίας συνιστάται να λαμβάνουν τη συνήθη δόση.
- Ασθενείς που έχουν έκπωση και στη νεφρική και στην ηπατική λειτουργία μπορεί να παίρνουν μικρότερη δόση ανάλογα με τη βαρύτητα της νεφρικής και ηπατικής νόσου τους ενώ η δόση για τα παιδιά πρέπει επίσης να είναι ανάλογη με το βάρος τους σώματός τους. Η δόση θα οριστεί από το γιατρό σας.
- Δεν απαιτείται η προσαρμογή της δόσης σε ηλικιωμένους ασθενείς, εφόσον η νεφρική τους λειτουργία είναι φυσιολογική.

Πώς και πότε πρέπει να πάρετε το Contrahist

Χορηγείται μόνο από το στόμα.

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται δοσιμετρική σύριγγα [βλ. διάγραμμα για τον τρόπο που θα τη χρησιμοποιείτε]. Το πόσιμο διάλυμα λαμβάνεται είτε χωρίς αραίωση είτε αραίωμένο σε ένα ποτήρι νερό.

To Contrahist μπορεί να λαμβάνεται με χώρις τροφή.

Χρήση της δοσιμετρικής σύριγγας

• Βαθύτερη τη δοσιμετρική σύριγγα στο περιεχόμενο της φάλλης και τραβήγετε το έμβολο μέχρι το σημείο που αντιστοιχεί στη δόση εκφρασμένη σε χλιοστόλιτρα (ml) που έχει καθορίσει ο γιατρός σας. Για χρήση σε παιδιά κάτω των 6 ετών, η ημερήσια δόση των 5 ml θα γίνει σε δύο λήψεις από 2,5 ml η κάθε μία (δηλ. παράλληλη σε προσέξετε τις υποδιαιρέσεις της δοσιμετρικής σύριγγας).

• Βγάλτε τη δοσιμετρική σύριγγα από τη φάλλη και αδειάστε το περιεχόμενο της σε ένα κουτάλι ή ένα ποτήρι νερό πέλζοντας το έμβολο προς τα κάτω. Η λήψη του φαρμάκου από το στόμα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την αραίωση.



Διάρκεια της θεραπείας με το Contrahist

Η διάρκεια της χρήσης του Contrahist εξαρτάται από τον τύπο, τη διάρκεια και την εξέλιξη των ενοχλήσεών σας και καθορίζεται από το γιατρό σας.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Contrahist από ότι πρέπει

Αν πάρετε μεγαλύτερη δόση πόσιμου διαλύματος Contrahist από την κανονική, στους ενήλικες μπορεί να προκληθεί υπνηλία. Τα παιδιά ενδέχεται αρχικά να εκδηλώσουν διέγερση και ανησυχία και στη συνέχεια υπνηλία.

Εάν νομίζετε ότι έχετε πάρει αυξημένη δόση Contrahist, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας. Αυτός θα αποφασίσει ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν.

Εάν ξεχάστε να πάρετε Contrahist

Αν ξεχάστε μια δόση Contrahist ή αν πάρετε δόση μικρότερη από αυτήν που συνέστησε ο γιατρός σας, μην διπλασιάσετε την επόμενη δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Συνεχίστε τη θεραπεία παιρνοντας την επόμενη κανονική δόση στην ώρα της.

Εάν σταματήστε τη χρήση του Contrahist

Η διακοπή της θεραπείας Contrahist δε θα πρέπει να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Τα συμπτώματα μπορεί να επανέλθουν, όχι όμως χειρότερα από εκείνα που είχατε πριν από τη θεραπεία.

Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικές με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν τις εμφανίζουν όλοι οι ασθενείς.

Συνήθειες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα

Έρροστοιμια, κεφαλαιγιά, αισθήμα κόπωσης και υπνηλία / νύστα.

Ασυνήθειες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα

Κόπωση και κοιλιακό δάγκωμα.

Μη γνωστές: Η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες όπως αισθηματικά παθήματα, ταχυπαλμία, σπασμοί, μούδισμα, ζάλη, απώλεια συνείδησης, τρόμος, δυσαρεστία (αλλοιώση της αισθησης της γεύσης), ίλιγγος, διαταραχές της όρασης, θολή όραση, επώδυνη ή δύσκολη ούρηση, αδυναμία να αδειάσει εντελώς η κύστη, οιδόμα, κνημιαρδός (φαγούρα), εξάνθημα, κνιδωση (πρήξιμο, ερυθρότητα και φαγούρα του δέρματος), δύσπνοια, αύξηση σωματικού βάρους, μυϊκός πόνος, επιθετική ή δισταραγμένη συμπεριφορά, ψευδαισθήσεις, κατάθλιψη, αϋπνία, αυτοκτονικός ιδεασμός, ηπατίτιδα, μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία, έμετος, αυξημένη όρεξη και ναυτία έχουν επίσης αναφερθεί.

Με την εμφάνιση των πρώτων σημείων αντίδρασης υπερεναίσθησιας σταματήστε να χρησιμοποιείτε το Contrahist και ενημερώστε το γιατρό σας.

Τα συμπτώματα μιας αντίδρασης υπερεναίσθησιας περιλαμβάνουν οιδήμα του στόματος, της γλώσσας, του προσώπου και/ή του φάρυγγα, δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση (σφίξιμο στο στήθος ή συριγμός), κνιδωση, αιφνίδια πάθηση της αρτηριακής πίεσης με συνέπεια κατέρρεψη ή σοκ, που μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο.

Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενέργειών

Εάν παρουσιάστε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό περιλαμβάνει και ανεπιθύμητες ενέργειες που πιθανόν να μην αναγράφονται στο παρόν φύλλο οδηγιών. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του ιστόποτου www.eof.gr. Αναφέροντας ανεπιθύμητες ενέργειες, βοηθάτε στην παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια αυτού του φαρμάκου.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ CONTRAHIST

- Φυλάξτε αυτό το φάρμακο σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο αν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του μηνός.
- Μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Διατηρείτε το μπουκάλι καλά κλεισμένο. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.
- Μετά το πρώτο άνοιγμα της φίλαλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 3 μηνών.
- Μην απορρίπτετε φάρμακο μέσω των ακαθάρων νερών ή οικιακών αποβλήτων. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να απορρίψετε φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το Contrahist

- Η δραστική ουσία είναι διϋδροχλωρική λεβισοεπιτριζήνη. Κάθε 1 ml πόσιμου διαλύματος περιέχει 0.5 mg διϋδροχλωρικής λεβισοεπιτριζήνης.
- Τα άλλα συστατικά είναι υγρή μαλπίτολη (E965), γλυκερίνη (E 422), σακχαρινικό νάτριο, τριένυνδρο οξικό νάτριο, οξείδιο οξεύ, βενζοϊκό νάτριο (E 211), άρωμα αγριοφράουλας: [αρωματικές ουσίες, φυσικές αρωματικές ουσίες, προπολεονγκούλη (E1520)], κεκαθαριμένο νόστρο.

Ποια εμφάνιση έχει το Contrahist και το περιεχόμενο της συσκευασίας

Το πόσιμο διαλύμα είναι διαυγές και όχρωμο με οσμή και γεύση αγριοφράουλας και είναι συσκευασμένο σε φίλαλη 200 ml.

Η φιάλη του πόσιμου διαλύματος διατίθεται σε κουτί από χαρτόνι, που περιέχει επίσης μια δοσιμετρική σύριγγα και ένα φύλλο οδηγιών για την χρήση.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

PHARMA Q.A.E., Ερέσου 6, Νέα Σμύρνη, 17121, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 9374576-8

Παραγωγός

Medana Pharma SA, ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz, Poland / Πολωνία

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στα Κράτη Μέλη του ΕΟΧ με τις παρακάτω ονομασίες:

{Πολωνία}	{Contrahist}
{Τσεχία}	{Contrahist 0,5 mg/ml perorálny roztok}
{Ρουμανία}	{Contrahist 0,5 mg/ml solutie orala}
{Σλοβακία}	{Contrahist 0,5 mg/ml perorálny roztok}
{Ελλάδα}	{Contrahist 0,5 mg πόσιμο διάλυμα}