

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

**Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.**

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν θα πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα κι όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλέσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

### Σε αυτό το φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το Licepler και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Licepler
3. Πώς να πάρετε το Licepler
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Licepler
6. Λοιπές πληροφορίες

### 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LICEPLER ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το Licepler ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων γνωστών ως κλεκτικοί αναστολείς της αλδοστερόνης. Αυτοί οι παράγοντες αναστέλλουν τη δράση της αλδοστερόνης, μιας ουσίας που παράγεται στον οργανισμό και ελέγχει την αρτηριακή σας πίεση και την καρδιακή σας λειτουργία. Τα υψηλά επίπεδα αλδοστερόνης μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στον οργανισμό σας, οι οποίες οδηγούν σε καρδιακή ανεπάρκεια.

Το Licepler αποτρέπει την επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας μετά από καρδιακή προσβολή, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.

### 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LICEPLER

#### Μην πάρετε το Licepler

- σε περίπτωση υπερευαισθησίας (αλλεργίας) στην επλερενόνη ή σε άλλα συστατικά του Licepler
- σε περίπτωση που έχετε υψηλά επίπεδα καλίου στο αίμα σας (υπερκαλιαιμία)
- σε περίπτωση που παίρνετε κατηγορίες φαρμάκων που βοηθούν στην απέκκριση της περίσσειας σωματικών υγρών, (καλιουσηνηρητικά διουρητικά) ή «δισκία άλατος» (συμπληρώματα καλίου)
- σε περίπτωση που πάσχετε από μέτρια έως σοβαρή νεφρική νόσο
- σε περίπτωση που πάσχετε από σοβαρή ηπατική νόσο
- σε περίπτωση που παίρνετε φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μυκητιασικής λοίμωξης (κετοконаζόλη ή ιτρακοναζόλη)
- σε περίπτωση που παίρνετε αντική φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του HIV (νελφινάβιρ ή ριτοναβίρ)
- σε περίπτωση που παίρνετε αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων (κλαριθρομικίνη ή τελθρομικίνη)
- σε περίπτωση που παίρνετε νεφροζωδόνη, η οποία χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της κατάθλιψης.

#### Προσέξτε ιδιαίτερα με το Licepler

- σε περίπτωση που έχετε νεφρική ή ηπατική νόσο (βλ. επίσης «Μην πάρετε το Licepler»)
- σε περίπτωση που παίρνετε λίθιο (συνήθως χορηγείται για μανιοκαταθλιπτική διαταραχή, η οποία καλείται και διπολική διαταραχή)
- σε περίπτωση που παίρνετε τακρόλιμους ή κυκλοσπορίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία δερματικών παθήσεων, όπως ψωρίαση ή έκζεμα και για την αποφυγή της απόρριψης του μοσχεύματος μετά από μεταμόσχευση)

#### Λήψη άλλων φαρμάκων

Παρακαλέσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή. Δεν πρέπει να παίρνετε το Licepler με τα ακόλουθα φάρμακα (βλ. ενότητα «Μην πάρετε το Licepler»):

- Ιτρακοναζόλη ή κετοконаζόλη (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μυκητιασικών λοιμώξεων), νελφινάβιρ, ριτοναβίρ (αντική φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του HIV), κλαριθρομικίνη, τελθρομικίνη (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων) ή νεφροζωδόνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της

κατάθλιψης), καθώς αυτά τα φάρμακα μειώνουν την αποδόμηση του Licepler, επιμηκύνοντας έτσι τη δράση του στον οργανισμό.

- Καλιουσηνηρητικά διουρητικά (φάρμακα που βοηθούν στην απέκκριση της περίσσειας σωματικών υγρών) και συμπληρώματα καλίου (δισκία άλατος), καθώς αυτά τα φάρμακα αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλών επιπέδων καλίου στο αίμα σας. Παρακαλέσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν παίρνετε κάποιο από τα ακόλουθα φάρμακα:
- Λίθιο (συνήθως χορηγείται για μανιοκαταθλιπτική διαταραχή, η οποία καλείται και διπολική διαταραχή). Η χρήση του λίθιο σε συνδυασμό με διουρητικά και αναστολείς ΑΜΕΑ (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής νόσου) έχει δείξει ότι αυξάνει υπερβολικά το επίπεδο λίθιο στο αίμα, προκαλώντας παρενέργειες όπως απώλεια όρεξης, διαταραχή της όρασης, κόπωση, μυϊκή αδυναμία, μυϊκοί σπασμοί).
- Τακρόλιμους ή κυκλοσπορίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία δερματικών παθήσεων, όπως ψωρίαση ή έκζεμα και για την αποφυγή της απόρριψης του μοσχεύματος μετά από μεταμόσχευση). Αυτά τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν νεφρικά προβλήματα και, επομένως, να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλών επιπέδων καλίου στο αίμα σας.
- Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ – συγκεκριμένα αναλγητικά όπως η βουπροφαίνη, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση του πόνου, της δυσκαμψίας και της φλεγμονής). Αυτά τα φάρμακα μπορούν να αυξήσουν σε νεφρικά προβλήματα και, επομένως, να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλών επιπέδων καλίου στο αίμα σας.
- Η τριμεθοπρίμη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων) μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλών επιπέδων καλίου στο αίμα σας.
- Οι αναστολείς ΑΜΕΑ (όπως η εναλαπρίλη) και οι ανταγωνιστές υποδοχών αγγειοτασίνης II (όπως η κανδεσαρίνη) (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης, της καρδιακής νόσου και συγκεκριμένων νεφρικών παθήσεων) μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλών επιπέδων καλίου στο αίμα σας.
- Οι αναστολείς άλφα I, όπως η πραζοσίνη και η αλφουζοσίνη (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης και συγκεκριμένων παθήσεων του προστάτη) μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της αρτηριακής πίεσης και ζαλάδα σε όρθια θέση.
- Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, όπως η αμιτριπυλίνη ή αμοξαβίνη (για τη θεραπεία μορφών κατάθλιψης), τα αντιμυχιατικά (γνωστά και ως νευροληπτικά) όπως η χλωροπρομαζίνη και η αλοπεριδόλη (για τη θεραπεία ψυχωρικών διαταραχών), η αμφοσίνη (χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας για τον καρκίνο) και η βακλοφαίνη (χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των μυϊκών σπασμών). Αυτά τα φάρμακα οδηγούν σε μείωση της αρτηριακής πίεσης και ζαλάδα σε όρθια θέση.
- Τα γλυκοκορτικοειδή, όπως υδροκορτιζόνη ή πρεδνιζόνη (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της φλεγμονής και συγκεκριμένων δερματικών παθήσεων) και τετρακοστακτίδη (χρησιμοποιείται κυρίως για τη διάγνωση και τη θεραπεία διαταραχών του φλοιού των επινεφριδίων) μπορούν να μειώσουν τη δράση του Licepler όσον αφορά την ελάττωση της αρτηριακής πίεσης.
- Διοξίνη (χρησιμοποιείται στη θεραπεία καρδιακών παθήσεων). Τα επίπεδα της διοξίνης στο αίμα ενδέχεται να αυξηθούν όταν χορηγείται ταυτόχρονα με το Licepler.
- Βαρφαρίνη (αντιπηκτικό φάρμακο): Συνιστάται προσοχή κατά τη λήψη της Βαρφαρίνης, καθώς τα υψηλά επίπεδα Βαρφαρίνης στο αίμα μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στη δράση του Licepler στον οργανισμό.
- Η ερυθρομικίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων), η σκινναβίρ (αντική φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του HIV), η φλοκοναζόλη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία μυκητιασικών λοιμώξεων), η αμιοδαρόνη, διλταζέμη και βεραπαμίλη (για τη θεραπεία καρδιακών προβλημάτων και της υψηλής αρτηριακής πίεσης), μειώνουν την αποδόμηση του Licepler, επιμηκύνοντας έτσι τη δράση του στον οργανισμό.
- Τα βαλοαμοχόλη (φυσικό ιατρικό προϊόν), η ριφαμικίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων), η φαινοϊνίνη, καρβιμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη (χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη θεραπεία της επιληψίας) μπορούν να αυξήσουν την αποδόμηση του Licepler, μειώνοντας έτσι τη δράση του.

#### Λήψη του Licepler με τροφές και ποτά

Μπορείτε να παίρνετε το Licepler με ή χωρίς τροφές.

#### Κύηση και θηλασμός

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας

προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο. Η δράση του Licerpler δεν έχει αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης σε ανθρώπους.

Δεν είναι γνωστό εάν η επλερερόνη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Θα πρέπει να αποφασιστεί, σε διαβούλευση με το γιατρό σας, εάν πρέπει να σταματήσετε το θηλασμό ή τη λήψη του φαρμάκου.

### Οδηγηση και χειρισμός μηχανών

Ενδέχεται να νιώσετε ζαλάδα μετά τη λήψη του Licerpler. Εάν συμβεί αυτό, μην οδηγήσετε και μην χειριστείτε μηχανές.

### Σημαντικές πληροφορίες για ορισμένα από τα συστατικά του Licerpler:

Το επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Licerpler 25mg περιέχει 35,08mg και το επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Licerpler 50mg περιέχει 70,16mg λακτόζη (ως μονοϋδρική λακτόζη). Εάν ο γιατρός σας σας έχει πει ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, ενημερώστε τον προτού πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

### 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LICEPLER

Πάντοτε να παίρνετε το Licerpler αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Μπορείτε να παίρνετε τα δισκία Licerpler με τροφή ή σε άδειο στομάχι. Καταπιείτε τα δισκία ολόκληρα, με άφθονο νερό.

Το Licerpler χορηγείται συνήθως σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα για την καρδιακή ανεπάρκεια, π.χ. βήτα αναστολείς. Η συνήθης δόση έναρξης είναι ένα δισκίο των 25mg μια φορά την ημέρα, ενώ μετά από περίπου 4 εβδομάδες αυξάνεται σε 50mg μια φορά την ημέρα (είτε ως ένα δισκίο 50mg είτε ως δύο δισκία 25mg).

Τα επίπεδα καλίου στο αίμα θα πρέπει να μετρώνται πριν την έναρξη της θεραπείας με Licerpler, εντός της πρώτης εβδομάδας και στον ένα μήνα μετά την έναρξη της θεραπείας ή μετά από αλλαγή δόσης. Η δόση ενδέχεται να προσαρμοστεί από το γιατρό σας, ανάλογα με τα επίπεδα καλίου στο αίμα σας.

Σε ασθενείς με ήπια νεφρική νόσο και ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπιατική νόσο, δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης έναρξης. Εάν έχετε ηπιακή ή νεφρική προβλήματα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο συχνή εξέταση των επιπέδων καλίου στο αίμα σας (βλ. επίσης «Μην πάρετε το Licerpler»)

### Χρήση σε ηλικιωμένους

Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης έναρξης.

### Χρήση σε παιδιά και εφήβους

Δεν συνιστάται η χορήγηση του Licerpler.

### Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Licerpler από την κανονική

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Licerpler από την κανονική, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Σε περίπτωση λήψης υπερβολικής ποσότητας φαρμάκου, τα πιθανότερα συμπτώματα είναι χαμηλή αρτηριακή πίεση (εκφράζεται ως αίσθηση ελαφρότητας στο κεφάλι σας, ζαλάδα, θολή όραση), αδυναμία, εξάι απώλεια συνείδησης) ή υπερκαλιαιμία, υψηλά επίπεδα καλίου στο αίμα (εκφράζεται με μυϊκές κράμπες, διάρροια, ναυτία, ζαλάδα ή πονοκέφαλο).

### Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Licerpler

Εάν έχει φθάσει σχεδόν η ώρα που θα πρέπει να πάρετε το επόμενο δισκίο, τότε πρέπει να παραλείψετε το δισκίο που χάσατε και να πάρετε το επόμενο δισκίο στην ώρα του.

Ειδικά, πρέπει να πάρετε το δισκίο αμέσως μόλις το θυμηθείτε, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 12 ώρες μέχρι την καθορισμένη ώρα λήψης του επόμενου δισκίου. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στην κανονική λήψη του φαρμάκου.

### Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε.

### Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Licerpler

Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε το Licerpler όπως σας έχει συνταγογραφηθεί, εκτός εάν σας συμβουλευτεί ο γιατρός σας να σταματήσετε τη θεραπεία.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

### 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Licerpler μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

**Εάν εκδηλώσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια:**

- διόγκωση προσώπου, γλώσσας ή λαιμού
  - δυσκολία στην κατάποση
  - πομφοί και δυσχέρεια αναπνοής
- Αυτά είναι συμπτώματα αγγειονευρωτικού οιδήματος.

### Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί:

**Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:** εμφανίζονται σε 1 έως 10 στους 100 χρήστες

- αυξημένα επίπεδα καλίου στο αίμα (τα συμπτώματα περιλαμβάνουν μυϊκές κράμπες, διάρροια, ναυτία, ζαλάδα ή πονοκέφαλο)
- ζαλάδα
- χαμηλή αρτηριακή πίεση
- διάρροια
- ναυτία
- μη κανονική νεφρική λειτουργία
- εξάνθημα

**Ασυνήθιστες ανεπιθύμητες ενέργειες:** εμφανίζονται σε 1 έως 10 στους 1.000 χρήστες

- ημιανοφιλία (αύξηση σε συγκεκριμένα λευκά αιμοσφαίρια)
- σφιδώτωση
- αυξημένη ποσότητα χοληστερόλης ή τριγλυκεριδίων (λιπών) στο αίμα
- χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα
- απντία (δυσκολία στον ύπνο)
- πονοκέφαλος
- καρδιακές ενοχλήσεις, π.χ. άτακτος καρδιακός παλμός, καρδιακή προσβολή και καρδιακή ανεπάρκεια
- μειωμένη αρτηριακή πίεση που μπορεί να προκαλέσει ζαλάδα σε όρθια θέση
- θρόμβωση (θρόμβοι αίματος) στα κάτω άκρα
- πόνος στο λαιμό
- μετεωρισμός
- έμετος
- κνησμός
- αυξημένη εφίδρωση
- πόνος στην πλάτη
- κράμπες στα κάτω άκρα
- αίσθημα αδυναμίας και γενικής αδιαθεσίας
- αυξημένα επίπεδα ουρίας και κρεατινίνης στο αίμα, τα οποία ενδέχεται να υποδεικνύουν νεφρικά προβλήματα
- φλεγμονή των νεφρών
- διόγκωση των μαστών στους άνδρες

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

### 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ LICEPLER

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα επικαλυμμένα με υμένιο δισκία Licerpler μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία των κυψελών ή στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται. Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το ιατρικό προϊόν. Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορριπτούν στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

### 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

#### Τι περιέχει το Licerpler

**- Η δραστική ουσία είναι η επλερερόνη.** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 25mg ή 50mg επλερερόνης.

**- Τα άλλα συστατικά είναι:** Πυρήνας δισκίου: Μονοϋδρική λακτόζη, Μικροκρυσταλλική κυταρίνη (τύπου 101), Νιτριούχος κροσκαρμελόζη, Υππρομελόζη (τύπου 2910), Μικροκρυσταλλική κυταρίνη (τύπου 102), Λαουρυλοθειικό νάτριο, Τάλκη, Στεατικό μαγνήσιο. **Επικάλυψη δισκίου:** Μονοϋδρική λακτόζη, Υππρομελόζη (τύπου 2910), Διοξείδιο τιτανίου (E171), Μακρογόλη 4000.

#### Εμφάνιση του Licerpler και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το δισκίο Licerpler 25mg είναι ένα λευκό ή σχεδόν λευκό, στρογγυλό, αμφικυρτό, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Εγχάραξη στη μία πλευρά: "CG3", η άλλη πλευρά δεν φέρει εγχάραξη.

Το δισκίο Licerpler 50mg είναι ένα λευκό ή σχεδόν λευκό, στρογγυλό, αμφικυρτό, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Εγχάραξη στη μία πλευρά: "CG4", η άλλη πλευρά δεν φέρει εγχάραξη.

#### Συσκευασίες που εγκρίθηκαν κατά την αποκεντρωμένη διαδικασία:

30, 90 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία συσκευάζονται σε συσκευασίες κυψελών PVC / αλουμίνιο και χροτόνια κοιλία. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλα τα μεγέθη συσκευασίας.

#### Συσκευασίες που θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά:

Μέγεθος συσκευασίας: 30, 90 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

#### Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός

• **Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:** IASIS PHARMA, Λεωφ. Φυλής 137, 13451 Καματερό Αττικής, Ελλάδα. Τηλ: + 30 210 6109080

#### • Παραγωγός

- Gedeon Richter Plc., H-1103 Βουδαπέστη, Gýmóti út 19-21.- Ουγγαρία.
- Laboratorios LICONSA S.A., Avenida Miralcampo, 7 Polígono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara.- Ισπανία.

**Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι εξουσιοδοτημένο στα Κράτη Μέλη της ΕΕΑ υπό τις ακόλουθες ονομασίες:**  
Ουγγαρία, Ελλάδα: Licerpler 25/50 mg

**Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 25-6-2012**

**Τρόπος διάθεσης:** Με ιατρική συνταγή.